

Porcentaje de cabezas analizadas para detectar tuberculosis



El indicador refleja el porcentaje de la población de bovinos que ha sido probada para verificar la presencia de la enfermedad en los animales (reactores a la tuberculosis bovina). Aquellos que resultan positivos son los que se eliminarán en rastros y se procede a la indemnización para el productor. Es importante señalar que en el caso de tuberculosis no existe vacuna para bovinos.

Detalles del indicador

Identificador:	JEA3-006	Tipo del indicador:	Resultado
Nivel del indicador:	Nivel: 3 .-Complementario	Dependencia que reporta en MIDE:	Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
Periodicidad:	Anual	Año base:	2007

Último valor disponible	Unidad de medida	Meta 2025	Tendencia deseable
13.2	Porcentaje	---	 Ascendente (Conviene a Jalisco que aumente)

Reportado al:
31/12/2024


Fuente: Comité Estatal de Fomento y Protección Pecuaria de Estado de Jalisco, Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, y Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria . Cifras preliminares 2024.

Porcentaje de cabezas analizadas para detectar tuberculosis

Valores históricos

Año	Valor
2024	13.2
2023	12.7
2022	13.36
2021	14.6
2020	13.51
2019	10.9
2018	9.9
2017	15.2
2016	11.23
2015	12
2014	11.57
2013	9.87
2012	12.47
2011	13.91
2010	11.77
2009	17
2008	17.8
2007	17.9

Gráfica de avance



Alineación al Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo y Metas

Eje: Jalisco, economía que avanza

Programa: 3.- Jalisco, economía que avanza

Temática: 15.- Campo próspero y tecnificado

Objetivo de desarrollo: Impulsar el desarrollo productivo, la modernización y la tecnificación sostenible del sector agropecuario en Jalisco, promoviendo la rentabilidad, la responsabilidad ambiental y la innovación, además de fomentar el desarrollo rural integral.

Fecha de descarga: 02-01-2026 07:38

Porcentaje de cabezas analizadas para detectar tuberculosis

Metodología

Metodología: Los médicos veterinarios aprobados muestran a los animales en campo. Detectan la presencia de la enfermedad y se instruye al productor para el envío del animal al rastro. El rancho se cuarentena.

Fórmula: $PCT=(PBA/PB)*100$

Variables: PCT=Porcentaje de cabezas analizadas para detectar tuberculosis PBA=Población bovina analizada para detectar tuberculosis PB=Población total bovina

Datos desagregados disponibles del indicador



Por estado



Por municipio de Jalisco



Por región de Jalisco



Por área metropolitana de Jalisco

Más información

<https://mide.jalisco.gob.mx/mide/panelCiudadano/detalleIndicador/1124>